



Ханты-Мансийский окружной центр
медицинской профилактики

наркотики наглатулы спайд

В жизни есть
много прекрасного,
каким будет Ваш
завтрашний день –
выбирать Вам!



НАРКОТИКИ

ГЕПАТИТЫ



СПИД



Лица, употребляющие внутривенные наркотики, являются резервуаром возбудителей гепатитов В, С, D и ВИЧ-инфекции.

Гепатиты

По данным мировой медицинской литературы, более половины потребителей наркотиков являются резервуаром нескольких вирусов в различных сочетаниях, наиболее распространено сочетание возбудителей гепатитов В и С.

После заражения, которое обычно происходит в течение первого года внутривенного употребления наркотических препаратов, у трети развивается острый вирусный гепатит. Среди больных наркоманов, находящихся в инфекционных отделениях, у 40-60% диагностируется гепатит смешанной этиологии (В+С), у 30-40% – острый вирусный гепатит С, в 20-30% случаев – острый вирусный гепатит В.

Гепатит С – самый серьёзный из всех трёх. Гепатит С – самая распространённая болезнь наркотически зависимых и чаще остальных переходит в хроническую форму. Через кровь вирус гепатита проникает в печень и начинает размножаться там, поражая внутренний орган человека. Зарождение происходит моментально, но болезнь дает о себе знать лишь через 2-24 недели, таков ее инкубационный период, а зачастую долгие годы не проявляет себя, а человек становится носителем вируса, не зная об этом. Хронический гепатит С лидирует среди причин, требующих пересадки печени. Существует несколько видов гепатита С, поэтому заболеть можно неоднократно. Гепатит С гораздо чаще протекает вообще без симптомов, а итогом могут быть цирроз, рак печени, поэтому не зря его называют «ласковым убийцей».

Вакцины против гепатита С есть нет!

ВИЧ-инфекция

Порядка 70% ВИЧ инфицированных больных получили смертельный вирус вследствие употребления наркотиков. А если взять во внимание тот факт, что средний возраст наркоманов около 30 лет, т.е. это люди детородного возраста, то наркомания – это угроза выживанию нации. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) постепенно убивает способность организма бороться с болезнями, ВИЧ разрушает белые кровяные тельца, являющиеся частью иммунной системы организма. Нельзя однозначно сказать, что у всех ВИЧ инфицированных разовьётся СПИД (синдром приобретённого иммунодефицита, конечная стадия ВИЧ-инфекции). Однозначно лишь то, что у людей с ВИЧ-инфекцией возникнут серьёзные проблемы со здоровьем. Возможно, не сразу; возможно, это произойдёт через годы. ВИЧ-инфекция остаётся с человеком на всю жизнь и может передаваться другим людям. Отсутствие или наличие ВИЧ-инфекции в организме определяется только при тестировании (анализе крови).

Поэтому, профилактика наркомании важна т.к. наркомания опасное заболевание не только для самого человека, но и для общества. Наркомания наносит катастрофический ущерб личности. Ложь, предательство, преступления, распад семей, смертельные болезни, всё это спутники наркомании.



НАРКОТИКИ

ГЕПАТИТЫ

СПИД

Лица, употребляющие внутривенные наркотики, являются резервуаром возбудителей гепатитов В, С, D и ВИЧ-инфекции.

Гепатиты

По данным мировой медицинской литературы, более половины потребителей наркотиков являются резервуаром нескольких вирусов в различных сочетаниях, наиболее распространено сочетание возбудителей гепатитов В и С.

После заражения, которое обычно происходит в течение первого года внутривенного употребления наркотических препаратов, у трети развивается острый вирусный гепатит. Среди больных наркоманов, находящихся в инфекционных отделениях, у 40-60% диагностируется гепатит смешанной этиологии (В+С), у 30-40% – острый вирусный гепатит С, в 20-30% случаев – острый вирусный гепатит В.

Гепатит С – самый серьёзный из всех трёх. Гепатит С – самая распространённая болезнь наркотически зависимых и чаще остальных переходит в хроническую форму. Через кровь вирус гепатита проникает в печень и начинает размножаться там, поражая внутренний орган человека. Заражение происходит моментально, но болезнь дает о себе знать лишь через 2-24 недели, таков ее инкубационный период, а зачастую долгие годы не проявляет себя, а человек становится носителем вируса, не зная об этом. Хронический гепатит С лидирует среди причин, требующих пересадки печени. Существует несколько видов гепатита С, поэтому заболеть можно неоднократно. Гепатит С гораздо чаще протекает вообще без симптомов, а итогом могут быть цирроз, рак печени, поэтому не зря его называют «ласковым убийцей».

Вакцины против гепатита С есть нет!

ВИЧ-инфекция

Порядка 70% ВИЧ инфицированных больных получили смертельный вирус вследствие употребления наркотиков. А если взять во внимание тот факт, что средний возраст наркоманов около 30 лет, т.е. это люди детородного возраста, то наркомания – это угроза выживанию нации. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) постепенно убивает способность организма бороться с болезнями, ВИЧ разрушает белые кровяные тельца, являющиеся частью иммунной системы организма. Нельзя однозначно сказать, что у всех ВИЧ инфицированных разовьётся СПИД (синдром приобретённого иммунодефицита, конечная стадия ВИЧ-инфекции). Однозначно лишь то, что у людей с ВИЧ-инфекцией возникнут серьёзные проблемы со здоровьем. Возможно, не сразу; возможно, это произойдёт через годы. ВИЧ-инфекция остаётся с человеком на всю жизнь и может передаваться другим людям. Отсутствие или наличие ВИЧ-инфекции в организме определяется только при тестировании (анализе крови).

Поэтому, профилактика наркомании важна т.к. наркомания опасное заболевание не только для самого человека, но и для общества. Наркомания наносит катастрофический ущерб личности. Ложь, предательство, преступления, распад семей, смертельные болезни, всё это спутники наркомании.

